



Commissario ad acta per l'emergenza COVID-19

presso la Direzione Sanitaria di Presidio degli Ospedali Riuniti "Siacca-Ribera"

N.1

Protocollo Infection Control

Applicare le seguenti indicazioni:

- ☐ Visitare i casi sospetti di nCoV in un'area separata dagli altri pazienti
- ☐ Ospedalizzare il paziente in isolamento in un reparto dedicato, in attesa di trasferimento presso una Unità Operativa di Malattie Infettive, possibilmente in stanza singola facendo indossare al paziente una mascherina chirurgica se riesce a tollerarla
- ☐ Limitare il numero di operatori sanitari, e vietare l'accesso di familiari e di visitatori a contatto con il caso e registrare di seguito i contatti

OPERATORI SANITARI:

Applicare le precauzioni di isolamento da contatto e trasmissione per via aerea:

- ☐ Mascherina e protezione facciale
- ☐ Camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti
- ☐ Mascherina FFP2 in caso di procedure che possano generare aerosol

Si raccomanda di utilizzare strumenti monouso e strumentazioni portatili per evitare di muovere il paziente.

Qualora il paziente venga posto in ISOLAMENTO DOMICILIARE, sia il paziente che i familiari devono essere istruiti per applicare le precauzioni standard di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per aerosol e per contatto.

L'OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti: alcol etilico 70% per gli strumenti, acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante per la pulizia di ambienti e superfici.